

＜抗体検査とワクチン接種推奨値＞

項目	検査方法	抗体(-)	(+-)	(+)	ワクチン接種推奨
麻疹(はしか)	EIA法-IgG	2.0未満	2.0~15.9	16.0以上	<16
	FIA法			≥ 1.1	Bio-Rad(AI:抗体価) <1.5
	PA法	16倍未満	16~128	256倍以上	<256
	NT法	4倍未満	4倍	8倍以上	
風疹	HI法	8.0未満	8.0~16	32	<32
	EIA法-IgG	2.0未満	2.0~7.9	8.0以上	<8
	FIA法			≥ 1.0	Bio-Rad(AI:抗体価) <1.0
水痘	EIA法-IgG	2.0未満	2.0~3.9	4.0以上	<4
	FIA法			≥ 1.1	Bio-Rad(AI:抗体価) <0.5
	IAHA法	2倍未満	2倍	4倍以上	
	NT法	2.0未満	2.0~3.9	4.0以上	5.0~8.0より低値
流行性耳下腺炎 (ムンプス・おたふくかぜ)	EIA法-IgG	2.0未満	2.0~3.9	4.0以上	<4
	FIA法			≥ 1.1	Bio-Rad(AI:抗体価) <1.3

※FIA法: Fluorescence Immunoassay(蛍光免疫測定法)

※FA法: Fluorescent Antibody Method(蛍光抗体法)

※EIA: Enzyme Immunoassay(酵素免疫測定法)

※NT法: Neutralization Test(中和法)

※PA法: Particle Chain Reaction(粒子凝集反応)

※HI法: Hemagglutination(赤血球凝集反応)

※AI: 抗体価を表す指標、ワクチン接種基準の単位