

＜海外渡航とワクチン接種について＞

地域・滞在期間		黄熱	ポリオ	日本脳炎	A型肝炎	B型肝炎	狂犬病	破傷風
東アジア	短期				○			
	長期			○	◎	○	○	◎
東南アジア	短期				○			
	長期			○	◎	○	○	◎
南アジア	短期				○			
	長期		○	○	◎	○	○	◎
中近東	短期				○			
	長期		○		◎	○	○	◎
太平洋地域	短期				○			
	長期				○	○	○	◎
オセアニア	短期							
	長期							◎
北アフリカ	短期				○			
	長期		○		◎	○	○	◎
中央アフリカ	短期	●			○			
	長期	●	○		◎	○	○	◎
南アフリカ	短期				○			
	長期		○		◎	○	○	◎
北・西ヨーロッパ	短期						○	◎
	長期							
東ヨーロッパ	短期							
	長期		○		○	○	○	◎
南ヨーロッパ	短期							
	長期				○	○	○	◎
ロシア	短期							
	長期				○	○	○	◎
北米	短期							
	長期						○	◎
中南米	短期	●			○			
	長期	●			◎	○	○	◎

●: 黄熱に感染するリスクがある地域

◎: 予防接種を勧める地域

○: 局地的な発生があり、リスクがある場合に接種を検討する地域

※長期とは、およそ一ヶ月以上滞在する場合を想定。冒険旅行は短期間でも長期に準じた接種を！

■各種予防接種について

・A型肝炎: 2～4週間隔で2回接種。6ヶ月以上滞在時は6ヶ月目にさらにもう1回接種で約5年間有効。

・狂犬病: 4週間隔で2回接種。さらに6～12ヶ月後に3回目を接種。

・日本脳炎: 1～4週間隔で2回接種。1年後追加接種。4～5年間有効。

・B型肝炎: 4週間隔で2回接種。さらに20～24週間後にもう1回接種。

・ポリオ: アフガニスタン、ナイジェリア、パキスタン等で流行。渡航前に追加接種を！

・黄熱: 黄熱予防接種証明書は接種後10日目から10年間有効。

・ジフテリア: 昭和43年から開始の3種混合ワクチンに含まれる。定期予防接種で12歳時に2種混合ワクチンを受けていると20代前半まで免疫あり。その後は1回ずつ追加接種で10年間有効。

・麻疹: 現在は定期予防接種で2回接種。1回のみあるいは接種不明の場合、接種勧める。